

Behandling med Centyl med Kaliumklorid

Behandlingsstart

Du starter typisk med 1 tablet dagligt. Dette kan senere øges til maksimalt 2 tabletter en gang dagligt, hvis dit blodtryk endnu ikke har nået det mål, som du er blevet enig med lægen eller sygeplejersken om.

Hvordan virker Centyl?

Centyl sænker blodtrykket, da det er let vanddrivende.

Hvilke bivirkninger kan jeg få?

Centyl giver relativt sjældent bivirkninger. Enkelte kan føle svimmelhed, hovedpine, øget tørst og mundtørhed eller få lavt salt (natrium og kalium) i blodet. Vi kontrollerer saltene i blodet med de årlige blodprøver.

Hvornår skal man være forsigtig med Centyl-behandling?

Nyrefunktion måler vi i noget, der hedder eGFR. Normale værdier ligger over 60. Ved svært nedsat nyrefunktion med eGFR under 30 har Centyl ingen effekt. Det er ikke farligt at fortsætte, men vil ikke have effekt og bør derfor stoppes.

Hvis du har urinsyregigt, kan Centyl medføre let øget risiko for anfald af urinsyregigt.

Andre navne for Centyl

Apoteket udleverer det billigste præparat. Centyl kan også hedde Bendroza. Det er samme præparat.

Kort om forhøjet blodtryk

Forhøjet blodtryk gennem mange år kan medføre åreforkalkning, hvilket på sigt kan føre til blodpropper i hjertet eller hjernen, nedsat syn, nedsat nyrefunktion, dårlig blodomløb, etc. Det er ikke kun forhøjet blodtryk, der kan medføre åreforkalkning. Forhøjet blodsukker (som ved diabetes), for højt kolesterol, rygning, overvægt og usund kost kan også medføre åreforkalkning. Vi vil derfor ved konsultationerne hos os tale med dig om disse emner.