

## Behandling med Scatol (Ivermectin) mod fnat

Tag Scatol om eftermiddagen/aftenen med vand – se nedenstående skema hvor mange tabletter du skal tage. Du må ikke spise to timer før og to timer efter indtagelsen.

Behandlingen gentages efter 7 dage.

Huden kan klø op til 4-6 uger efter endt behandling, men hvis der ikke tilkommer nye, aktive hudforandringer den første uge efter endt behandling, kan man regne med at være helbredt for fnat. Hvis der kommer nye, aktive hudforandringer da kontakt lægen mhp. ny vurdering.

Brug evt. fed fugtighedscreme. Lægen kan ordinere antihistamin og/eller steroidcreme. Man er smittefri 8-12 timer efter de første tabletter.

Foruden den person der har fået konstateret fnat skal alle husstandsmedlemmer og nære kontakter behandles. Det er afgørende for succesfuld behandling, at alle behandles på samme tid og nedenstående sanering i huset også gennemføres.

Det bør ikke anvendes ved graviditet, amning eller vægt < 15 kg. Det bør heller ikke tages sammen med lægemidlerne morfin, carbamazepin, verapamil eller marevan.

LEGEMSVÆGT (kg)	DOSIS (antal tabletter a 3 mg)
15-24 kg	1 tbl dag 1 og dag 8
25-35 kg	2 tbl dag 1 og dag 8
36-50 kg	3 tbl dag 1 og dag 8
51-65 kg	4 tbl dag 1 og dag 8
66-79 kg	5 tbl dag 1 og dag 8
80+ kg	6 tbl dag 1 og dag 8

### Tiltag i hjemmet

I hjemmet udføres følgende tiltag i forbindelse med 1. behandling og igen ugen efter i forbindelse med 2. behandling.

Sengetøj, håndklæder og tøj skal vaskes ved 60 grader. Såfremt tøjet ikke kan vaskes ved 60 grader, bør det henstå urørt (fx i en plasticpose) i 1 uge.

Større beklædningsgenstande og overtøj, dyner, tæpper, puder og madrasser luftes godt og køligt og sættes bort i 1 uge. Miden vil dø efter 4 døgn uden kontakt med hud.

Støvsug senge og møbler med betræk / polstring og rengør hjemmet med almindelige rengøringsmidler.